

Thema	Analyse / Material	Preis
<p>Sexuell übertragbare Krankheiten</p> <p>Geschlechtskrankheiten HIV , Syphilis, und Hepatitis B+C</p> <p>Syphilis, HIV, Hepatitis B und Hepatitis C gehören zu den häufigsten durch Geschlechtsverkehr übertragbaren Krankheiten. Mit dieser Laboranalyse erhalten Sie schnell und einfach Gewissheit darüber ob Sie sich infiziert haben oder nicht. Bitte beachten Sie das allerdings in den ersten Tagen oder Wochen nach einer Risikosituation die Ergebnisse negativ ausfallen können. Aus diesem Grund sind die Nachweisgrenzen einzuhalten.</p> <p>Hinweis: Bitte beachten Sie die Nachweiszeiten.</p> <p><u>Wann kann getestet werden?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • HIV: ab 2 Wochen (Schlusskontrolle nach 2 Monate) • Hepatitis B: ab 2 Wochen (Schlusskontrolle nach 3 Monaten) • Hepatitis C: ab 6 Wochen (Schlusskontrolle nach 5 Monate) • LUES (Syphilis): ab 3 Wochen (Schlusskontrolle nach 3 Monate) 	<p>HIV Syphilis Hepatitis B Hepatitis C</p> <p>Blutabnahme Serum</p>	<p>117.50 CHF (Preis inkl. Taxe und BE)</p>

Thema	Analysen / Material	
<p>Die häufigsten Geschlechtskrankheiten</p> <p>Syphilis (LUES), HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Chlamydien und Gonorrhoe sind die häufigsten, durch Geschlechtsverkehr übertragbaren Krankheiten. Mit dieser Laboranalyse erhalten Sie schnell und einfach Gewissheit darüber ob Sie sich infiziert haben oder nicht. Bitte beachten Sie das allerdings in den ersten Tagen oder Wochen nach einer Risikosituation die Ergebnisse negativ ausfallen können. Aus diesem Grund sind die Nachweisgrenzen einzuhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HIV: ab 2 Wochen (Schlusskontrolle nach 2 Monate) • Hepatitis B: ab 2 Wochen (Schlusskontrolle nach 3 Monaten) • Hepatitis C: ab 6 Wochen (Schlusskontrolle nach 5 Monate) • Lues (Syphilis): ab 3 Wochen (Schlusskontrolle nach 3 Monate) • Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae: ab 8 Tagen 	<p>Blutentnahme Serum</p> <ul style="list-style-type: none"> • HIV • Lues (Syphilis) • Hepatitis B+C <p>1. Morgenurin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chlamydia trachomatis • Neisseria gonorrhoeae <p>Hinweis: Vor der Probenentnahme bitte 2 Stunden lang kein Urin lösen.</p>	<p>184.10 CHF (Preis inkl. Taxe und BE)</p>

Hinweis: Vor der Probenentnahme bitte 2 Stunden lang kein Urin lösen.		
<p>Chlamydien + Gonorrhoeae PCR Test</p> <p>Chlamydien und Gonorrhoe (Tripper) sind die häufigsten, durch Geschlechtsverkehr übertragbaren Krankheiten. Früh erkannt, können beide Erkrankungen gut behandelt werden. Nicht behandelt, können diese Erreger die Ursache der Unfruchtbarkeit und somit zu dem unerfüllten Kinderwunsch führen. Der Nachweis der Krankheitserreger erfolgt durch die hocheinsensitive PCR-Analytik.</p> <p>Hinweis: Vor der Probeentnahme bitte 2 Stunden lang kein Urin lösen.</p> <p><u>Wann testen?</u> 8 Tage nach Risikokontakt Ab dem 8. Tag nach einem Risikokontakt ist eine Testung auf die Erreger sinnvoll. Dieser Test ist nur für den normalen Geschlechtsverkehr (Genital) geeignet.</p>	<p>1. Morgenurin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neisseria gonorrhoeae • Chlamydia trachomatis <p>Hinweis: Vor der Probeentnahme bitte 2 Stunden lang kein Urin lösen.</p>	<p>98.60 CHF (Preis inkl. Taxe und BE)</p>